

Deze kaart moet altijd bij je zijn

Veiligheidsinformatie voor patiënten

Waarschuwingkaart voor patiënten

Belangrijke veiligheidsinformatie voor personeel van spoedeisende dienst

Tolvaptan kan leverbeschadiging veroorzaken. Er moeten regelmatig leverfunctietests worden uitgevoerd (de eerste 18 maanden maandelijks, daarna om de 3 maanden). In geval van leverbeschadiging of klinisch significante afwijkende verhogingen van ALAT en ASAT dient de behandeling met tolvaptan onmiddellijk te worden onderbroken.

Tolvaptan blokkeert de werking van vasopressine in de nieren en kan grote urinevolumes en ernstige dehydratie veroorzaken. Symptomen van uitdroging kunnen zijn verhoogde dorst, droge mond, zich moe of slaperig voelen, verminderd urineren, hoofdpijn, droge huid, duizeligheid, snelle hartslag, verwarring en slechte huidelasticiteit.

Naam van patiënt:

Datum waarop tolvaptan voor het eerst is voorgeschreven:

Naam van arts:

Naam van behandelend centrum:

Telefoonnummer van behandelend centrum:

Belangrijke veiligheidsinformatie voor patiënten

Tolvaptan kan een invloed hebben op de werking van uw lever. Raadpleeg uw arts als u symptomen hebt van vermoeidheid, verlies van eetlust, pijn in de buik, donkere urine, gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht), koorts, ernstige uitdroging, misselijkheid, braken, jeuk of gewrichts-en spierpijn met koorts.

Tolvaptan kan ernstige uitdroging (dehydratie) veroorzaken. Drink voldoende om dehydratie te voorkomen en raadpleeg uw arts als u niet kunt drinken.